

MALADIE DU FEUILLAGE DES LAURIERS CERISES



SYMPTÔMES:

Dépôt blanchâtre sur les jeunes feuilles surtout le revers, entraînant d'abord une déformation de celle-ci. Ensuite, un brunissement et la perforation des feuilles atteintes. Enfin, chute de celles-ci, surtout les plus atteintes. Ceci est dû à une maladie cryptogamique (*Sphaerotheca pannosa*): L' **OIDIUM PERFORANT DU LAURIER CERISE**.

COMMENT TRAITER?

- 1 tailler les extrémités atteintes. Les brûler, les détruire ou les évacuer mais surtout ne pas les conserver dans un coin du jardin ou sur le compost.
- 2 pulvériser avec:
 - a. **ROVRAL** ou **BAYFIDAN 40 ML**
 - b. **FORMUSTART 100 ML**

Ces DEUX produits sont à mélanger dans 10 litres d'eau.

Faire une première série de **quatre pulvérisations**, chacune à 1 semaine d'intervalle.

Ensuite pulvériser une fois toutes les 2 semaines. Le traitement doit se faire par temps calme, sur un feuillage sec, pas en plein soleil et il ne peut pas pleuvoir dans les 6 heures qui suivent la pulvérisation.

CAUSE :

Cette maladie apparaît surtout sur des plantes sensibilisées par un état de famine, manque de fertilisations régulières, et des conditions climatiques favorables. L'acidité du sol rend les lauriers encore plus sensibles. Un pH trop bas (trop acide) entraînant une mauvaise absorption de la potasse (K). Dans le cas d'un pH vraiment trop bas, la potasse disparaît. Or, celle-ci est un élément majeur dans la nutrition des végétaux. Non seulement elle stimule la floraison et la fructification mais surtout, c'est l'élément principal du renforcement des cellules. Sa carence n'empêche pas la plante de pousser. Mais les feuilles seront plus fines, plus tendres et de ce fait, beaucoup plus sensibles aux maladies.

COMMENT L' EVITER DANS L' AVENIR ?

Ce n'est pas parce-que votre haie a sa taille optimale que vous ne devez plus la nourrir correctement. Elle s'affaiblit avec le temps. Les plantes seront plus sensibles aux maladies, au gel et à la sécheresse.

Nous vous conseillons de suivre ce plan de fertilisation:

- a. en mars, mai, juillet et septembre, apport d'un ENGRAIS DCM spécial pour haies à feuillage persistant + du CALCAIRE VERT ou du MAERL.
- b. En novembre, épandez du CALCAIRE VERT ou du MAERL+ de la potasse.
- c. En février épandez du fumier sec DCM P.V.Ch..

Pour vraiment faire un travail juste et efficace, nous vous conseillons de faire une analyse de votre terre. Venez avec un échantillon de sol (un petit pot de yaourt suffit!). Grâce à cela, nous pourrions vous donner un conseil personnalisé.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous les renseignements qui vous seraient utiles.